

AWAS

a) **Bahaya Kepada Manusia:** Berbahaya jika terhiru wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, JANGAN makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakanannya. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak.

Pakaian dan Alat Perlindungan: Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawaian termasuk sarung tangan, gogal, kasut getah, penutup muka dan alat pernafasan (respirator).

b) **Bahaya Pada Alam Sekitar:** Produk ini adalah berbahaya pada organisme aquatik dan ikan. JANGAN cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

TANDA KERACUNAN

Mual, muntah, sakit perut, cirit-birit. Dalam kes yang serius terdapat gangguan saraf.

RAWATAN KECEMASAN

Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, JANGAN ikhtiarkan pesakit itu muntah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN

Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit.

MEDICAL TREATMENT

Treatment is symptomatic.

BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.

EMPTY PESTICIDE CONTAINER SHOULD BE TRIPLE RINSED BEFORE DISPOSAL. DO NOT USE EMPTY PESTICIDE CONTAINER TO STORE FOODSTUFF.

有害品
勿貯藏在靠近食品或
兒童所接觸的地方

HARMFUL
KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND CHILDREN

D-CYHALOTHRIN*

PEKATAN TEREMULSI (EC)
RACUN SERANGGA / INSECTICDE

UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG YANG TERLATIH SAHAJA
(TO BE USED BY TRAINED PERSONNEL ONLY)

Perawis Aktif: lambda-cyhalothrin	2.5% w/w
Perawis Lengai:	97.5% w/w

No. Pendaftaran : LRMP. R1/9072 Kandungan Bersih : 1 liter

Tarikh Mengilang :

Didaftarkan oleh:

Sekilas Karisma

Sekilas Karisma (M) Sdn. Bhd.
No. 11-2, Jalan Meranti SD 13/4,
Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur.
Tel.: 03-6272 1678 Fax: 03-6272 9528

Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi:

PUSAT RACUN NEGARA - 1-800-88-8099 (waktu pejabat)
- 012-430 9499 (lepas waktu pejabat)

BACA LABEL SEBELUM GUNA

* Trademark of Sekilas Karisma (M) Sdn. Bhd.

KELAS III

BERBAHAYA
JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN KANAK-KANAK

D-CYHALOTHRIN* adalah sejenis racun serangga daripada kumpulan pyrethroid. Ia bertindak secara sentuhan dan keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN

Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan.

Serangga	Teknik Penggunaan	Kadar Campuran Racun	Isi Padu Sembur
Nyamuk (<i>Aedes aegypti</i> , <i>Culex quinquefasciatus</i>)	1) Semburan Rawatan Sisabaki Luar dan dalam bangunan menggunakan alat penyembur tekanan	20 ml / 1 liter air	40 ml/meter persegi
Lalat (<i>Musca domestica</i>)	2) Semburan Ruang a) Thermal	20 ml +1liter minyak tanah /diesel	2 liter /ha
Lipas (<i>Blattella germanica</i>)		80 ml+1liter minyak tanah /diesel	
	b) Pengabutan Sejuk- ULV	80 ml +1liter air	0.5 liter /ha
	3) Semburan Biasa	4 ml + 1liter air	100 liter /ha

Panduan Menbacuh

Disyorkan menggunakan alat penyembur yang bermozel 'solid cone'. Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan D-CYHALOTHRIN* secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukat dan bacuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi dari yang disyorkan. Jangan simpan baki bacuhan D-CYHALOTHRIN*di dalam tangki alat penyembur.

Panduan Menyembur

Lakukan semburan pada waktu petang (5.00-7.00 ptg) untuk kawalan nyamuk. Pastikan orang awam dan penduduk dikeluarkan dari premis/rumah. Tutup semua makanan yang ada di atas meja dan akuarium ikan. Ulangi semburan 7 hari sekali, jika perlu sahaja. Untuk mengelakkan kesan kerintangan, selangi produk ini dengan racun serangga yang mempunyai cara tindakan yang berbeza. Jika rawatan perlu diulangi, gunakan D-CYHALOTHRIN* berselang-seli dengan racun serangga daripada kumpulan berlainan yang mempunyai cara tindakan yang berbeza.

Tempoh Dilarang Masuk Semula Kawasan Rawatan (REI): 12 jam

தங்கீழைப்பது
உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு
அருசில் வைக்காதீர்