

MOSBAIT 1.0 GR* ialah racun serangga tidak sistemik daripada kumpulan organophosphate yang bertindak sebagai penghalang ‘cholinesterase’.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan. Untuk kawalan jejentil nyamuk, gunakan MOSBAIT 1.0 GR* seperti berikut:

Tempat / Keadaan	Serangga	Kadar Racun	Catatan
1) Bekas pengisi air, tangki air, penjerat semut dan pasu bunga.	Nyamuk (<i>Aedes sp</i>)	Gunakan 10 g bagi tiap-tiap 90 liter air (bersamaan dengan 5 tin minyak tanah)	MOSBAIT 1.0 GR* boleh juga digunakan di tempat-tempat nyamuk membiak dan kawasa air bertakung. Tabur MOSBAIT 1.0 GR* dengan rata dan ulangkan penggunaanya 2-3 bulan sekali, jika perlu.
2) Kawasan air cetepek, kolam air, parit-parit dan becak.		5 kg/hektar permukaan air.	

AWAS

a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertelan. Elakkan daripada terhadu debu. Elakkan daripada terkena pada kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, JANGAN makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan basuh badan sebersih-bersihnya dengan sabun dan air. Tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Jangan mengumpulkan racun ini di tempat yang senang dicapai oleh kanak-kanak dan binatang berguna.

Pakaian dan Alat Perlindungan: Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawaiannya termasuk sarung tangan, gogal, penutup muka dan alat pernafasan (respirator).

b) Bahaya Pada Alam Sekitar: Produk ini adalah berbahaya pada organisme akuatik dan ikan. JANGAN cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

TANDA KERACUNAN

Berpeluh, pening, sakit kepala, mual, muntah, pandangan kabur, sesak nafas, cirir-birit, kejang otot dan besar ludah.

RAWATAN KECEMASAN

Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersilikan dengan menggunakan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, ikhtiarkan supaya pesakit itu muntah dengan menjolok jari ke dalam kerongkong selepas diberi minum air. JANGAN beri apa-apa melalui mulut dan JANGAN ikhtiarkan pesakit itu muntah jika dia tidak sedar. Dapatkan rawatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN

Suntikkan Atropina sulfat (2-4 mg) secara intravena atau intraotot. Ulangkan setiap 30 minit hingga pesakit itu pulih sepenuhnya. Kemudian suntikkan pralidoksim (1 g) secara intravena, jika perlu.

MEDICAL TREATMENT

Inject Atropine sulphate (2-4 mg) intravenously or intramuscularly. Repeat every 30 minutes until the patient is fully atropinised. Then administer pralidoxime (1 g) intravenously, if necessary.

勿貯藏在靠近食品或
兒童所接觸的地方

KELAS IV

உணவுகள் மற்றும் குழந்தை
களுக்கு அருகில் வைக்காதீர்

MOSBAIT 1.0 GR*

RACUN SERANGGA / INSECTICIDE
BUTIR (GR)



Perawis Aktif: temephos 1.0% w/w
Perawis Lengai: 99.0% w/w

No. Pendaftaran : LRMP. R1/7742 Kandungan Bersih : 100 g

Tarikh Mengilang :

Didaftarkan oleh :

Sekilas Karisma (M) Sdn. Bhd. (528804-T)

No. 11-2, Jalan Meranti SD 13/4,
Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel.: 03-6272 1678 Faks: 03-6272 9528

Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi:

PUSAT RACUN NEGARA - 1-800-88-8099 (waktu pejabat)
- 012-430 9499 (lepas waktu pejabat)

BACA LABEL SEBELUM GUNA

**BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA.
JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.
EMPTY PESTICIDE CONTAINER SHOULD BE TRIPLE RINSED BEFORE
DISPOSAL. DO NOT USE EMPTY PESTICIDE CONTAINER TO STORE FOODSTUFF.**

* Trademark of Sekilas Karisma (M) Sdn. Bhd.

**JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN
KANAK-KANAK**

KELAS IV

**KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND
CHILDREN**