

**ABATE® 500** ialah sejenis racun serangga yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan 'organophosphate' yang tidak sistemik dan bertindak sebagai penghalang cholinesterase.

**ATURAN PENGGUNAAN:** Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Raun Makhlik Perosak 1974.

TEMPAT / KEADAAN	PEROSAK	KADAR RACUN		ISI PADU SEMBURAN SEHEKTAR
		10 Liter Air	Sehektar	
Kawasan air bertakung (Tasik, kolam longkang, parit atau tempat pembiakan nyamuk).	Jejentik ( <i>Culex quinquefasciatus</i> , <i>Aedes aegypti</i> )	12 ml (15 ml*)	120 ml (150 ml*)	100 liter
Dalam dan Luar Premis (Kediaman dan komersial)	Nyamuk ( <i>Aedes aegypti</i> )	Ultra low volume (ULV) 400 ml 160 ml	25 liter/ha (Mist Blower / Vehicle Mounted)	

\*Catatan: Untuk kawasan yang terdapat banyak tumbuhan tebal atau di kawasan yang mana airnya mengandungi banyak bahan organik.

#### Panduan Membancu

Disyorkan menggunakan alat penyembur galas bernozel "Flat Fan" saiz 5/64" atau penyembur ULV pada tekanan 4.5 psi (saiz titisan tidak melebihi 50 makron). Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan **ABATE® 500** secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukat dan bancu. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi daripada yang disyorkan. Jangan simpan baki bancuhan **ABATE® 500** di dalam alat penyembur.

#### Panduan Menyembur

Sembur secara menyeluruh untuk mendapatkan liputan yang baik. Ulangi semburan dalam masa 1 bulan (jika perlu) dengan menggunakan kadar yang sama. Jika rawatan perlu dilanggari, gunakan **ABATE® 500** berselang-seli dengan racun serangga daripada kumpulan berlainan yang mempunyai cara tindakan berbeza.

NO. KECEMASAN SYARIKAT Tel.: 03-5628 3999



#### நீங்கிழைப்பது

உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு அருகில் வைக்காது

**BASF**

We create chemistry

# ABATE® 500



## PEKATAN TEREMULSI (EC) UNTUK KEGUNAAN KESIHATAN AWAM

Perawis Aktif : temephos ..... 47.4% w/w  
Perawis Lengai : ..... 52.6% w/w

### RACUN SERANGGA

### INSECTICIDE

(1 liter mengandungi 500 g perawis aktif)

No. Pendaftaran : LRMP. R1/8673

Kandungan Bersih:

20 liter

Tarikh Mengilang :

Tarikh Luput :

Didaftarkan oleh:

**BASF (Malaysia) Sdn. Bhd.** (182671-M)

No. 2, Jalan Astaka U8/87, Bukit Jelutong, Seksyen U8,  
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Tel.: 03-5628 3888 Faks: 03-5628 3777

BACA LABEL SEBELUM GUNA

Jika berlaku KERACUNAN,  
sila hubungi TALIAN KECEMASAN:



P(L) 09/18

**BERBAHAYA**  
JAUHKAN DARIPADA  
MAKANAN  
DAN KANAK-KANAK

**KELAS III**

**AWAS:** a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika diminum. Elakkan daripada terhadu wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakan. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak.

**Pakaian dan Alat Perlindungan:** Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawai termasuk sarung tangan, gogal, kasut getah, penutup muka dan alat pernafasan.

b) Bahaya Pada Alam Sekitar: Produk ini adalah berbahaya pada organisme akuatik dan ikan. **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

**TANDA KERACUNAN:** Berpeluh, pering, sakit kepala, mual, muntah, pandangan kabur, sesak nafas, cirir-birir, kejang otot dan besar ludah.

**RAWATAN KECEMASAN:** Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, **JANGAN** ikhtiarkan pesakit itu muntah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

**RAWATAN PERUBATAN:** Suntikkan Atropina sulfat (2-4 mg) secara intravena atau intraotot. Ulangkan setiap 30 minit hingga pesakit itu pulih sepenuhnya, kemudian suntikkan pralidoksim (1 g) secara intravenously, jika perlu.

**MEDICAL TREATMENT:** Inject Atropine sulphate (2-4 mg) intravenously or intramuscularly. Repeat every 30 minutes until the patient is fully atropinised; then administer pralidoxime (1 g) intravenously, if necessary.

**BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.**

**EMPTY PESTICIDE CONTAINER SHOULD BE TRIPLE RINSED BEFORE DISPOSAL. DO NOT USE EMPTY PESTICIDE CONTAINER TO STORE FOODSTUFF.**

**HARMFUL**  
KEEP AWAY FROM  
FOODSTUFF  
AND CHILDREN

**有害品**  
勿貯藏在靠近食品  
或兒童所接觸的地方