



Storm® Securable

Perawis Aktif : floccoumafen 0.005% w/w
Perawis Lengal: 99.995% w/w

RACUN TIKUS

Kandungan Bersih: 3 kg

UMPAN BERBUNGKAH (BB)

No. Pendaftaran: LRMP. R1/6325

Didaftarkan oleh:

BASF (Malaysia) Sdn. Bhd. (182671-M)

No. 2, Jalan Astaka U8/87, Bulut Jejutong, Seksyen U8, 40150 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel.: 03-5628 3888 Faks: 03-5628 3777

Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi:

PUSAT RACUN NEGARA - 1-800-88-8099 (waktu pejabat)
- 012-4309499 (jepas waktu pejabat)

BACA LABEL SEBELUM GUNA

© Tanda Dagangan BASF



= **BASF**

We Create Chemistry

PLU 11/14

勿貯藏在靠近食品或 JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
兒童所接觸的地方 DAN KANAK-KANAK

KELAS IV

KEEP AWAY FROM FOODSTUFF
AND CHILDREN

ஏற்காடு நெடுஞ்செழியல்
குழுமம்

STORM® SECURABLE ialah sejenis racun tikus coumarin antikoagulan yang berkesan. **STORM® SECURABLE** mengawal tikus dengan sekuas makan. Tikus yang termakan racun akan mati 3 - 7 hari kemudian. Pada kebiasaanya, sesuatu populasi tikus citempat yang tertentu boleh dikawal dalam masa 30 hari.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan.

TEMPAT/ KEADAAN	PEROSAK	KADAR RACUN
Bangunan-bangunan seperti rumah, pejabat, stor dan kilang	Tikus Norway (Rattus norvegicus)	2 ketul umpan STORM® SECURABLE untuk setiap jarak 5 m di tepi dinding yang sering dilalui oleh tikus. Setiap minggu, gantikan umpan yang dimakan sehingga tiada umpan dimakan lagi.
	Tikus Rumah (Mus domesticus)	2 ketul umpan STORM® SECURABLE untuk setiap jarak 2 m di tepi dinding yang sering dilalui oleh tikus. Setiap minggu, gantikan umpan yang dimakan sehingga tiada umpan dimakan lagi.

PANDUAN MENGGUNA : Buat lawatan untuk menentukan kehadiran dan bilangan tikus. Kenalpasti tempat dan jalan yang digunakan oleh tikus. Letakkan umpan di atas 'dulang' di tempat yang sering dilalui oleh tikus. Teduhkan umpan dari kena hujan. Pastikan umpan terlindung dari binatang ternakan seperti anjing. Umpan boleh diletakkan dalam paip yang dipotong sepanjang 1 - 2 kaki, atau bawah atap zink. Adalah disyorkan sangkutkan **STORM® SECURABLE** pada paku dengan lubang yang disediakan supaya umpan tidak boleh dipindahkan. Jangan campurkan umpan dengan bahan makanan yang lain.

Letakkan umpan di setiap lokasi dengan ikatan dawai atau paku, atau dalam kotak umpan Tikus. **JANGAN** letakkan umpan pada atau di tempat berhampiran dengan perkakas makanan atau makanan yang terdedah, kawasan penyediaan makanan atau kawasan penyimpanan makanan.

NO. KECEMASAN Tel: 03-5626 3999



勿貯藏在靠近食品或
兒童所接觸的地方

JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK

KELAS IV

AWAS: a) Bahaya kepada Manusia: Berbahaya jika termakan. Elkann daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Jangan mengumpam racun ini di tempat yang senang dicapai oleh kanak-kanak dan binatang berguna. Cuci tangan sebersih-bersihnya selepas menggunakanannya. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak.

Pakaian dan Alat Perlindungan: Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian perlindungan diri (PPE) berpiawaien termasuk sarung tangan.

b) Bahaya Pada Alam Sekitar: **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

TANDA KERACUNAN: Pencegahan pembeikan darah, tahi dan kencing berdarah dan cucur darah sedikit di bawah kulit.

RAWATAN KECEMASAN: Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika termakan, klaharkan supaya pesakit itu muntah dengan menjolok jari ke dalam kerongkong, selepas diberi minum air. Ulangkan hingga air muntah menjadi jernih. **JANGAN** beri apa-apa melalui mulut dan **JANGAN** klaharkan pesakit itu muntah jika ia tidak sedar. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.

RAWATAN PERUBATAN: Antidot : Vitamin K1 (Pytomenadione)

Lakukan pengukuran waktu prothrombin. Bila waktu prothrombin meningkat, berikan Vitamin K1 dengan suntikan secara intravena setiap hari dengan dos 40 mg untuk orang dewasa (10 mg setiap 6 jam) dan 20 mg untuk kanak-kanak (5 mg setiap 6 jam). Teruskan rawatan sehingga tempoh prothrombin pulih seperti biasa. Pesakit harus diberi jagaan di bawah pengawasan perubatan selama sekurang-kurangnya 4 hari.

MEDICAL TREATMENT Antidote: Vitamin K1 (Pytomenadione) Determine prothrombin times. If elevation has occurred administer Vitamin K1 intravenously daily at a dosage of 40 mg for adults (10 mg every 6 hours) and 20 mg for children (5 mg for every 6 hours). Continue treatment until prothrombin times return to normal. Patient should be kept under medical supervision for at least 4 days.

Tarikh Menglang:

No. Kelompok:

KEEP AWAY FROM FOODSTUFF AND CHILDREN உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு அருகில் வைக்காதிரி