



Storm[®]

Perawis Aktif : flocoumafen 0.005% w/w
 Perawis Lengai : 99.995% w/w

RACUN TIKUS

Kandungan Bersih: 10 kg

UMPAN BERBUNGKAH (BB)

**KELUARAN INI TIDAK DISYORKAN
 JIKA PUNGGUK JELAPANG (BARN OWL)
 DIGUNAKAN UNTUK MENGAWAL TIKUS.**

Tarikh Mengilang:

No. Pendaftaran: LRMP. R1/2995



Didaftarkan oleh:

BASF (Malaysia) Sdn. Bhd. (182671-M)

No. 2, Jalan Astaka U8/87, Bukit Jelutong, Seksyen U8, 40150 Shah Alam,
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel.: 03-5628 3888 Faks: 03-5628 3777

Jika berlaku **KERACUNAN**, sila hubungi:

PUSAT RACUN NEGARA - 1-800-88-8099 (waktu pejabat)

- 012-4309499 (lepas waktu pejabat)

BACA LABEL SEBELUM GUNA

BASF
 We Create Chemistry

© Tanda Dagangan BASF

P(L) 05/16

勿貯藏在靠近食品或
 兒童所接觸的地方

**JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
 DAN KANAK-KANAK**

KELAS IV

**KEEP AWAY FROM FOODSTUFF
 AND CHILDREN**

உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு
 அருகில் வைக்காதி!

STORM® ialah sejenis racun tikus coumarin anticoagulan yang berkesan. **STORM®** mengawal tikus dengan sekali makan dan tikus akan mati setelah beberapa hari kemudian, oleh itu tidak menyebabkan segan umpan dan tidak perlu mengumpan kosong sebelum meletakkan racun tikus. Kebanyakan serangan dapat dikawal dalam masa 30 hari. **STORM®** adalah dalam bentuk sedia digunakan dan tidak perlu dicampurkan dengan bahan-bahan makanan lain.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan.

| KAWASAN TANAMAN | PEROSAK | KADAR RACUN SEHEKTAR | CARA PENGGUNAAN |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sawit | Tikus (<i>R. tiananicus</i>) | 136 Ketul umpan STORM® | Letakkan satu ketul umpan di pangkal setiap pokok sawit apabila banci buahan menunjukkan kerosakan pada tandan buah melebihi 5%. Gantikan setiap umpan yang dimakan setiap minggu sehingga bilangan umpan yang diganti menurun ke paras 20%. |
| Koko | Tikus (<i>R. rattus diardi</i>) | 160 Ketul umpan STORM® | Mula mengumpan apabila kerosakan melebihi 50 lenggai sehektar. Letakkan satu ketul umpan di pangkal pokok yang kelima dan gantikan setiap umpan yang dimakan sekali seminggu sehingga bilangan yang diganti menurun ke paras 20%. |
| Sawah Padi | Tikus (<i>R. argentiventer</i>) | 22 Ketul umpan STORM® | Letakkan satu ketul umpan setiap 10 hingga 15 m di atas batas dan di hadapan lubang tikus, sebelum menabur biji benih atau sebelum mengubah. Pengumpanan berikutnya dilakukan dua minggu selepas menabur atau menanam dan gantikan umpan yang dimakan setiap minggu sehingga bilangan umpan yang diganti menurun ke paras 20%. |

AWAS: a) **Bahaya kepada Manusia:** Berbahaya jika termakan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, pakai pakaian pelindung diri termasuk sarung tangan dan **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas dengan rapat dan simpan di tempat ber Kunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin.

Jangan mengumpan racun ini di tempat yang senang dicapai oleh kanak-kanak dan haiwan peliharaan. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak.

b) **Bahaya Pada Alam Sekitar:** **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

TANDA KERACUNAN: Pencegahan pembekuan darah, tahi dan kencing berdarah dan pendarahan sedikit di bawah kulit.

RAWATAN KECEMASAN: Jika tertelan, ikhtiarikan pesakit itu muntah dengan menjodok jari ke dalam kerongkong, selepas diberi minum air. Ulangkan hingga air muntah menjadi jernih. **JANGAN** beri apa-apa melalui mulut dan **JANGAN** ikhtiarikan pesakit itu muntah jika dia tidak sedar. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

STORM® is a potent coumarin anticoagulant rodenticide. **STORM®** will kill rats and mice following a single feed but death occurs after several days and so bait shyness and the need for pre-baiting are avoided. Most infestations will be eliminated in 30 days. **STORM®** is ready to use and should not be diluted by the addition of other food stuffs.

DIRECTIONS FOR USE: Off label use is an offence.

| CROPS AREAS | PESTS | RATES PER HECTARE | APPLICATION |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oil Palm | Rats (<i>R. tiananicus</i>) | 136 Cubes STORM® bait | Place one bait at the base of each palm when the monthly census show more than 5% fresh fruit damage. Replace all baits taken weekly until bait replacement is brought down to 20%. |
| Cocoa | Rats (<i>R. rattus diardi</i>) | 160 Cubes STORM® bait | Commence baiting when rat damage exceed 50 pods/ha. Place one bait at base of every 5th tree and replace all bait taken weekly until bait replacement is brought down to 20%. |
| Padi | Rats (<i>R. argentiventer</i>) | 22 Cubes STORM® bait | Place one bait every 10 to 15 m on bund and in front of burrows, before sowing or transplanting, follow up baiting should be done two weeks after sowing or transplanting and subsequently replace baits taken weekly until bait replacement is brought down to 20%. |

RAWATAN PERUBATAN: Antidote: Vitamin K1 (Pytomenadione)

Lakukan pengukuran waktu prothrombin. Bila waktu prothrombin meningkat, berikan Vitamin K1 dengan suntikan secara intravena tiap hari dengan dos 40 mg untuk orang dewasa (10 mg setiap 6 jam) dan 20 mg untuk kanak-kanak (5 mg setiap 6 jam) Teruskan rawatan sehingga tempoh prothrombin pulih seperti biasa. Pesakit harus diberi jagaan di bawah pengawasan perubatan sekurang-kurangnya 4 hari.

MEDICAL TREATMENT: Antidote: Vitamin K1 (Pytomenadione)

Determine prothrombin times, if elevation has occurred administer Vitamin K1 intravenously daily at dosage, 40 mg for adults (10 mg every 6 hours) and 20 mg for children (5 mg for every 6 hours). Continue treatment until prothrombin times return to normal. Patient should be kept under medical supervision for at least 4 days.

JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.

DO NOT USE EMPTY PESTICIDE CONTAINER TO STORE FOODSTUFF.

NO. KECEMASAN Tel: 03-5628 3999



勿貯藏在靠近食品或
兒童所接觸的地方

JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK

KELAS IV

KEEP AWAY FROM FOODSTUFF
AND CHILDREN

உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு
அருகில் வைக்காது