



TERMIGARD 38.7 EC ialah racun serangga daripada kumpulan 'organophosphate' yang bertindak secara sentuhan dan keracunan perut berkesan mengawal serangga seperti jadual di bawah.

ATURAN PENGGUNAAN : Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan.

SERANGGA	KAWASAN	KADAR RACUN / 10 LITER AIR	CARA PENGGUNAAN
Anai-anai (<i>Coptotermes</i> sp.)	Tanah Tapak Pembinaan (Sebelum Pembinaan)	130 ml	Sembur bancuhan pada semua sisi lubang asas dan tanah yang telah digali. Kadar bancuhan : 5L / m ²
		130 ml	Sebelum memasang lantai, sembur bancuhan pada permukaan tanah. Kadar bancuhan : 5L / m ²
Anai-anai (<i>Coptotermes</i> sp.)	Tanah Tapak Pembinaan (Selepas Pembinaan)	130 ml	Buatkan lubang-lubang suntikan dengan jarak 40-60 cm di antara satu dengan lain. Suntikkan bancuhan dengan menggunakan alat penyuntik. Kadar bancuhan : 6L / m panjang asas bangunan.

Didaftarkan oleh :



IMP BIOTECH SDN. BHD. (Co. No. 462270-H)

33A, Jalan 5, Kawasan 16, Taman Intan,
41300 Klang, Selangor, Malaysia.

Tel.: 603 3345 3769 Faks : 603 3341 7089