

LAVERMATE

PEKATAN TEREMULSI (EC)

RACUN SERANGGA / INSECTICIDE / 殺蟲劑



Perawis Aktif : temephos 44.6% w/w

Perawis Lengai : 55.4% w/w

No. Pendaftaran :
LRMP, R1/9041

Kandungan Bersih :
1 liter

Tarikh Mengilang :

UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG TERLATIH SAHAJA

Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi :

PUSAT RACUN NEGARA - 1 - 800 - 88 - 8099 (waktu pejabat)
- 012 - 430 9499 (lepas waktu pejabat)

BACA LABEL SEBELUM GUNA

Didaftarkan oleh :



IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. (100955-M)

37, Jalan 5, Kaw. 16, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia. Tel.: 603 - 3343 1633 Faks : 603 - 3343 1868

BERBAHAYA
JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK

KELAS III

LAVERMATE ialah sejenis racun serangga yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan 'organophosphate' yang bertindak secara sentuhan.
ATURAN PENGUNAAN : Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

TEMPAT / KEADAAN	PEROSAK	KEADAAN RAWATAN	KADAR RACUN		ISI PADU SEMBURAN SEHEKTAR
			10 Liter Air	Sehektar	
Bekas takungan air terbari, tasik, kolam, longkang, parit atau tempat pembibitan nyamuk	Jentik-jentik (<i>Aedes aegypti</i> , <i>Aedes albopictus</i> , <i>Culex quinquefasciatus</i> , <i>Culex gelidus</i> , <i>Culex fuscans</i>)	Sembur Biasa - Penyembur galas "Flat Fan" saiz 5/6"	12.5 ml (1:800)	125 ml	100 liter
Kesihatan Awam, Domestik	Nyamuk Dewasa (<i>Aedes aegypti</i> , <i>Aedes albopictus</i> , <i>Culex quinquefasciatus</i> , <i>Culex gelidus</i> , <i>Culex fuscans</i>)	Pengabutan ULV	2 L (1:5)	200 ml	1 liter
			4 L (1:2.5)	200 ml	500 ml
		Pengabutan Terma	400 ml (1:25)	200 ml	5 liter

Panduan Membancuh : Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan **LAVERMATE** secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi daripada yang disyorkan. Jangan simpan baki bancuhan **LAVERMATE** di dalam tangki alat penyembur.

Panduan Menyembur : **Jentik-jentik** : Untuk kawalan yang baik, sembur secara menyeluruh ke tempat pembibitan nyamuk. Ulangi semburan selang **2 bulan** sekali, apabila perlu sahaja. **Nyamuk Dewasa** : Ulangi semburan selang **7-10 hari** jika perlu. Selepas itu, kekerapan semburan boleh dikurangkan untuk menjaga populasi serangga pada tahap yang boleh diterima. Untuk kawalan yang baik, rawatan hendaklah dibuat pada awal pagi atau lewat petang di mana suhu di sekelling tidak melebihi 30°C dan angin tidak bertup kencang. Untuk kawalan jangkamasa panjang, semburan racun serangga hendaklah dijalankan bersama dengan kebersihan kawasan pembibitan melalui pemungutan sampah dan mengurangkan tempat pembibitan serangga. Jangan sembur pada/berhampiran dengan makanan/tempat penyediaan makanan. Jika rawatan perlu diulangi, gunakan **LAVERMATE** berselang-seli dengan racun serangga daripada kumpulan berlainan yang mempunyai cara findakan berbeza.

AWAS : a) Bahaya Kepada Manusia : Berbahaya jika terminum. Elakkan daripada terhadu wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum, atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakanannya. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak.

Pakaian dan Alat Perlindungan : Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawaian termasuk sarung tangan, gogol, kasut getah, penutup muka dan alat pernafasan.

b) Bahaya Pada Alam Sekitar : Produk ini adalah berbahaya pada ikan. **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

TANDA KERACUNAN : Berpeluh, pening, sakit kepala, mual, muntah, pandangan kabur, sesak nafas, cirir-birit, kejeng otot dan besar ludah.

RAWATAN KECEMASAN : Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, **JANGAN** ikhtiaran pesakit itu muntah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN : Suntik Atropine sulfat (2-4 mg) secara intervena atau intraotot. Ulang setiap 30 minit sehingga pesakit itu pulih dengan sepenuhnya. Kemudian suntik pralidoksim (1 g) secara intravena, jika perlu.

MEDICAL TREATMENT : Inject Atropine sulphate (2-4 mg) intravenously or intramuscularly. Repeat every 30 minutes until patient is fully atropinised. Then administer pralidoxime (1 g) intravenously if necessary.

BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.

HARMFUL
KEEP AWAY FROM FOODSTUFF
AND CHILDREN

有害品
勿貯藏在靠近食品或兒童所接觸
的地方

தீங்கிழைப்பனு
உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு
அருகில் வைக்காதீர்