

PREMINATOR® COCKROACH BAIT

PREMINATOR® COCKROACH BAIT

PREMINATOR® COCKROACH BAIT ialah racun serangga daripada kumpulan 'neonicotinoid' yang bertindak secara sistemik, sentuhan dan keracunan perut. Suntik umpan di kawasan persebunya lipas, hujung sudut di dalam almari, kabinet dan bawah sinki.

ATURAN PENGUNAAN :

Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

Kadar Serangan	Lipas German (<i>Blattella germanica</i>)	Lipas Amerika (<i>Periplaneta americana</i>)
Sederhana	1 titik/linear meter atau meter persegi (2.1 mg imidacloprid)	2 titik/linear meter atau meter persegi (4.2 mg imidacloprid)
Teruk	2 titik/linear meter atau meter persegi (4.2 mg imidacloprid)	3 titik/linear meter atau meter persegi (6.3 mg imidacloprid)

Saiz gel yang dicadangkan berdiameter 5mm bersamaan dengan 0.1g PREMINATOR® COCKROACH BAIT.

Periksa tempat rawatan selalu. Ulangi rawatan jika perlu atau bila umpan habis dimakan oleh lipas.

JANGAN LAKUKAN RAWATAN DI KAWASAN PENYEDIAAN MAKANAN.

AWAS : (a) Bahaya Kepada Manusia : Berbahaya jika terbakar. Elakkan terhadu wasap. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, JANGAN makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunki yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Pastikan cuci tangan sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak.

Pakaian dan Alat Perlindungan : Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawaian termasuk sarung tangan, gogol, kasut getah, penutup muka dan alat pemfasaan (respirator),

(b) Bahaya Pada Alam Sekitar : Produk ini adalah berbahaya pada organisme akuatik dan ikan, JANGAN cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

TANDA KERACUNAN : Sakit perut, mual, muntah, lesu dan pening.

RAWATAN KECEMASAN : Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, ikhtiarakan supaya pesakit itu muntah dengan menjolok jari ke dalam kerongkonk selepas diberi minum air. JANGAN beri apa-apa melalui mulut dan JANGAN ikhtiarakan pesakit itu muntah jika dia tidak sedar. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN : Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit.

MEDICAL TREATMENT : Treatment is symptomatic.

JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.

勿貯藏在靠近食品或
兒童所接觸的地方


KELAS IV

உணவுகள் மற்றும்
குழில்களுக்கு
அடுக்கல் வைக்காதீர்

JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN
DAN KANAK-KANAK

KELAS IV

KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF
AND CHILDREN



PREMINATOR® COCKROACH BAIT