

ATURAN PENGGUNAAN

SCEA PESGUARD 10ME ialah sejenis racun serangga daripada kumpulan pyrethroid yang bertindak secara serutuhan dan keracunan perit.
Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan

Serangga Persek Racun / 10 liter Air	Kadar Racun / 10 liter Air	Kadar Isi Padu Bancuhan	Kawasan Semburan	Cara Semburan
	1 liter	100 ml/1000 m ³		Sembur ruang dalam dan sekeliling bangunan dengan menggunakan ULV generator. Ulangi semburan selang 5 hari hanya jika perlu
Lalat (<i>Musca domestica</i>) Nyamuk (<i>Culex pipiens</i>)	1 liter	1 Liter/ha	Bangunan klang dapur dan sekeliling penyimpangan makanan	Sembur luar bangunan dengan menggunakan ULV generator. Ulangi semburan selang 5 hari hanya jika perlu
Kumbang Persek Tembaku (<i>Lasioderma serricorne</i>)	5 liter	200 ml/1000 m ³		Sembur pada lewat pelayat/awal malam dengan menggunakan ULV generator. Ulangi semburan selang 5 hari hanya jika perlu
Hamama (<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>)	400 ml 0.2-1.0	- 50 ml/m ²	Tiam atau fabrik lembur Pemandiri, kain lembur Pemandiri, kain lembur	Sembur tiam dan fabrik lembur menggunakan penyembur tangan dengan kadar 20 kali/m ² dengan kadar 20 kali/m ² pada pemandiri kain lembur
	90 ml SCEA Pesguard 10ME + 190 ml syampoo pemandiri jenis tidak beralkali dan dicairkan dalam 5 liter air. Sembur 500 ml/m ² pemandiri. Bilas mengikut arahan pada label syampoo			

Panduan Membancuh

Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan SCEA PESGUARD 10ME secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi dari yang disyorkan.

Panduan Menyembur

JANGAN sembur pada/bertampiran dengan makanan/tempat penyediaan makanan termasuk makanan ternakan

BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPOSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN. TANAM BEKAS RACUN APABILA KOSONG


勿貯藏在靠近
食品或
兒童所接觸的地方

KELAS IV

SCEA PESGUARD® 10ME

RACUN SERANGGA

EMULSI-MIKRO (ME)
(MICRO-EMULSION (ME))



Perawis Aktif: d-phenothrin 10.0% w/w
 Perawis Lengai: 90.0% w/w

UNTUK DIKENALIKAN OLEH ORANG YANG TERLATIH SAHAJA

No. Pendaftaran: LRMP, RI/8078
 Kandungan Bersih: 1 liter

Didaftarkan oleh:

SUMITOMO CHEMICAL
 Sunitomo Chemical Enviro-Agro Asia Pacific
 Sdn. Bhd. (Co. No. 404392-U)

Lot 62A Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang
 Industrial Park, 70400 Seremban, N Sembilan
 Tel: 06-6793711, Faks: 06-6793698
BACA LABEL SEBELUM GUNA

Jika berakur KERACUNAN, sila hubungi:
 PUSAT RACUN NEGARA - 1-800-88-8099 (waktu pejabat)
 - 012-4309499 (lepas waktu pejabat)

JAUHKAN DARIPADA MAKANAN DAN KANAK-KANAK

KELAS IV

KEEP AWAY FROM FOODSTUFF AND CHILDREN

உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கும் தூரத்தில் வைக்கండి

AWAS

a) Bahaya Kepada Manusia:

Berbahaya jika terminum. Elakkan daripada wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena pada kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, JANGAN makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan basuh badan bersih-bersihnya dengan sabun dan air. Tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci tangan dan alat penyembur bersih-bersihnya selepas menggunakannya.

Pakaian dan Alat Perlindungan

Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpakaian termasuk sarung tangan, gogal, penutup muka dan alat pernafasan (respirator) supaya tidak terhidu kabus semburan.

b) Bahaya Pada Alam Sekitar

Produk ini adalah berbahaya pada ikan, JANGAN cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

TANDA KERACUNAN

Pendedahan yang berlebihan menyebabkan petasan tegang dan sawari

RAWAATAN PERUBATAN

Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak. Jika terlelan, jangan ikhtikarkan pesakit itu muntah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera

RAWAATAN PERUBATAN

Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit. Jika terlelan, lakukan kurasan gaster dengan air garam yang suam. Berikan barbiturat dengan dos yang rendah

MEDICAL TREATMENT

Treatment is symptomatic. If swallowed, perform gastric lavage with warm saline water. Administer barbiturates in small doses

Tarikh Mengiang: