

AWAS

- a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika diminum. Elakkan daripada terhadu wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, JANGAN makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakanannya. Pastikan mandi sebersih-hersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak. Pakaian dan Alat Perlindungan: Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawaian termasuk sarung tangan, gogol, kasut getah, penutup muka dan alat pernafasan.
- b) Bahaya Pada Alam Sekitar: Produk ini adalah berbahaya pada organisme akuatik dan ikan. JANGAN cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

TANDA KERACUNAN

Gatal-gatal pada mata, hidung, kerongkong dan kulit. Pendedahan yang berlebihan boleh menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, pening dan sawan.

RAWATAN KECEMASAN

Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, JANGAN ikhtiarikan pesakit itu muntah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN

Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit.

MEDICAL TREATMENT

Treatment is symptomatic.

BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.

EMPTY PESTICIDE CONTAINER SHOULD BE TRIPLE RINSED BEFORE DISPOSAL. DO NOT USE EMPTY PESTICIDE CONTAINER TO STORE FOODSTUFF.

有害品
勿貯藏在靠近食品或
兒童所接觸的地方

HARMFUL
KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND CHILDREN

KELAS III**BACA LABEL SEBELUM GUNA**

BERBAHAYA
JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN KANAK-KANAK

D-CYHALOTHrin

PEKATAN TEREMULSI (EC)
RACUN SERANGGA / INSECTICIDE

UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG YANG TERLATIH SAHAJA
(TO BE USED BY TRAINED PERSONNEL ONLY)

Perawis Aktif: lambda-cyhalothrin	2.5% w/w
Perawis Lengai:	97.5% w/w

No. Pendaftaran : LRMP. R1/9072 Kandungan Bersih : 1 liter

Tarikh Mengilang :



Dynamic Agribusiness Sdn. Bhd. (544719-D)

No. 11-2, Jalan Meranti SD 13/4,
Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel.: 03-6272 9308 Faks: 03-6272 9528

Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi:

PUSAT RACUN NEGARA - 1-800-88-8099 (waktu pejabat)
- 012-430 9499 (lepas waktu pejabat)

D-CYHALOTHrin adalah sejenis racun serangga yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan 'pyrethroid'. Ia bertindak secara sentuhan dan keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN - Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

Serangga Perosak	Teknik Penggunaan	Kadar Campuran Racun	Isi Padu Semburan
Nyamuk (<i>Aedes aegypti</i> , <i>Culex quinquefasciatus</i>)	1) Semburan Rawatan Sisabaki Luar dan dalam bangunan menggunakan alat penyembur tekanan	20 ml / 1 liter air	40 ml/meter persegi
Lalat (<i>Musca domestica</i>)	2) Semburan Ruang a) Thermal	80 ml + 1 liter minyak tanah /diesel	2 liter /ha
Lipas (<i>Blattella germanica</i>)	b) Pengabutan Sejuk-ULV	80 ml - 1 liter air	0.5 liter /ha
	3) Semburan Biasa	4 ml + 1 liter air	100 liter /ha

Panduan Menbancuh

Disyar menggunakan alat penyembur yang bernozel 'solid core'. Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan D-CYHALOTHrin secukupnya mengikut syar yang ditetapkan dalam jadual sukar dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi daripada yang disyorkan. Jangan simpan baki bancuhan D-CYHALOTHrin di dalam tangki alat penyembur.

Panduan Menyembur

Lakukan semburan pada waktu petang (5.00-7.00 pg) untuk kawalan nyamuk. Pastikan orang awam dan penduduk dikeluarkan dari premis/rumah. Tutup semua makanan yang ada di atas meja dan akuarium ikan. Ulangi semburan 7 hari sekali, jika perlu sahaja. Jika rawatan perlu dilanggi, gunakan D-CYHALOTHrin berselang-seli dengan racun serangga daripada kumpulan berlainan yang mempunyai cara tindakan berbeza.

Tempoh Dilarang Masuk Semula Kawasan Rawatan (REI): 12 jam

தங்கிமைப்பது
உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு
அருகில் வைக்காதீர்