

TENOPA® ialah sejenis racun serangga campuran daripada kumpulan 'pyrethroid' yang mengganggu sistem saraf dan daripada kumpulan 'benzoylurea' sebagai pengawalatur tumbesaran serangga. Ia bertindak secara sentuhan dan keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

TEMPAT / KEADAAN	PEROSAK	KADAR RACUN	ISI PADU
		5 Liter Air / 100 m ²	SEMBURAN
Kediaman, hospital, hotel, restoran, dapur, premis-premis industri dan kilang-kilang memproses makanan.	Lipas 'German' (<i>Blattella germanica</i>) Lipas 'Amerika' (<i>Periplaneta americana</i>) Lalat (<i>Musca domestica</i>) Nyamuk (<i>Culex quinquefasciatus</i> , <i>Aedes aegypti</i>) Semut (<i>Lasius niger</i>) Kutu Kucing (<i>Ctenocephalides felis, adult</i>)	25 ml	50 ml / m ²
Permaidani (carpet), tilam, kertas dinding (wallpaper)	Pijit (<i>Cimex lectularius</i>)		

Panduan Membancuh : Disyor menggunakan alat penyembur tekanan tangan dengan nozel kipas. Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan **TENOPA®** secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi dari yang disyorkan. Jangan simpan baki bancuhan **TENOPA®** di dalam tangki alat penyembur.

Panduan Menyembur : Sembur ke atas permukaan di mana serangga perosak sering berkeliaran dan hinggap, serta ke dalam rekahan/lubang/tempat pembiakan atau persembunyiannya. Permukaan yang disembur akan memberikan kesan kawalan selama 4 minggu. Membasuh/mengelap permukaan tersebut selepas menyembur akan menjejaskan kesan kawalan.

Jangan sembur pada/berhampiran dengan makanan/tempat penyediaan makanan termasuk makanan ternakan.

Sebelum penggunaan - pindah atau tutup sangkar burung atau tangki ikan semasa semburan. Tutup semua bahan makanan yang terdedah, pinggan mangkuk dan perkakas dapur serta tempat-tempat di mana makanan disediakan atau disimpan.

Selepas penggunaan - biar peredaran udara sepenuhnya di kawasan rawatan. Bersihkan tempat rawatan sebelum pemrosesan atau sebelum perkhidmatan bermula semula.

TENOPA®

Perawis Aktif : alpha-cypermethrin 2.9% w/w
flufenoxuron 2.9% w/w
Perawis Lengai : 94.2% w/w

RACUN SERANGGA/INSECTICIDE PEKATAN AMPAIAN (SC)
UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG YANG TERLATIH SAHAJA

No. Pendaftaran : LRMP. R1/8407

Kandungan Bersih:

Tarikh Mengilang:

1 liter

No. Kelompok:



Pijit (x 5)
(*Cimex lectularius*)



Lipas 'Amerika' (x 1)
(*Periplaneta americana*)



Lipas 'German' (x 0.5)
(*Blattella germanica*)

Jika berlaku **KERACUNAN**, sila hubungi:

PUSAT RACUN NEGARA - 1-800-88-8099 (waktu pejabat)

- 012-4309499 (lepas waktu pejabat)

BACA LABEL SEBELUM GUNA

Didaftarkan oleh:

BASF (Malaysia) Sdn. Bhd. (182671-M)

No. 2, Jalan Astaka U8/87, Bukit Jelutong, Seksyen U8,
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tel.: 03-5628 3888 Faks: 03-5628 3777



P(L) 12/16

AWAS: a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika terminum. Elakkan daripada terhidu wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakannya. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak.

Pakaian dan Alat Perlindungan: Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawaian termasuk sarung tangan, gogal, kasut getah, penutup muka dan alat pernafasan.

b) Bahaya Pada Alam Sekitar: Produk ini adalah berbahaya pada organisma akuatik dan ikan. **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saluran air.

TANDA KERACUNAN: Gatal-gatal pada mata, hidung, kerongkong dan kulit. Pendedahan yang berlebihan boleh menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, pening dan sawan.

RAWATAN KECEMASAN: Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak sekurang-kurangnya selama 15 minit. Jika terhidu, bawa pesakit ke tempat yang mempunyai pengedaran udara yang bersih. Jika tertelan, **JANGAN** ikhtiarikan pesakit itu muntah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN: Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit.

MEDICAL TREATMENT: Treatment is symptomatic.

BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.

NO. KECEMASAN Tel: 03-5628 3999



有害品
勿貯藏在靠近食品或
兒童所接觸的地方

HARMFUL
KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND CHILDREN

KELAS III

BERBAHAYA
JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK

நீங்கிழைப்பது
உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு
அருகில் வைக்காதீர்