

Restricted to COMPETITIVE CUSTOMERS ONLY



RACUN SERANGGA GEL
UNTUK KAWALAN MAKHLUK PEROSAK (PCO) SAHAJA

Perawis Aktif: imidacloprid.....2.15% w/w
Perawis Lengah.....97.85% w/w

UNTUK DIKENDALIKAN OLEH OPERATOR KAWALAN
MAKHLUK PEROSAK (PCO) BERLESEN SAHAJA

No. Pendaftaran: LRMP: R5/5166

Kandungan Bersih: 1.2 kg (120 g x 10 kotak)

Tarikh Mengilang:

Tarikh Luput:

Batch No.:

Didaftarkan oleh: Bayer Co. (Malaysia) Sdn Bhd (7563 M)
B-19-1 & B-19-2, The Ascot Paradigm, No. 1
Jalan SS 7/26A, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia. Tel: 03-7601 3088

Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi
TALIAN KECEMASAN:

BACA LABEL SEBELUM GUNA

999

KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND
CHILDREN

KELAS IV

JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN
KANAK-KANAK

Premise Cockroach Bait ialah rumusan gel yang sedia digunakan untuk mengawal lipas di kawasan komersial dan industri.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak, 1974.

Suntik umpan di kawasan persembunyian lipas, hujung sudut di dalam almari, kabinet dan bawah sinki.

KADAR SERANGAN	LIPAS JERMAN (<i>Blattella germanica</i>)	LIPAS AMERIKA (<i>Periplaneta americana</i>)
Sederhana	1 titik se meter atau m ² (2.1 mg imidacloprid)	2 titik se meter atau m ² (4.2 mg imidacloprid)
Teruk	2 titik se meter atau m ² (4.2 mg imidacloprid)	3 titik se meter atau m ² (6.3 mg imidacloprid)

○ Saiz gel yang dicadangkan berdiameter 5 mm bersamaan dengan 0.1 g Premise Cockroach Bait.

Periksa tempat rawatan dengan kerap. Ulangi rawatan jika perlu atau bila umpan habis dimakan oleh lipas.

Panduan Mengumpan: Letakkan umpan berhampiran sarang dan tempat lipas bersembunyi. Lakukan pemeriksaan selepas 24 jam dan tambah umpan jika telah habis dimakan.

AWAS: a) **Bahaya Kepada Manusia:** Berbahaya jika tertelan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Kelika mengendalkan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mencendalkan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat terkunci yang mempunyai pederatan udara yang baik, kering dan dingin. Pastikan cuci tangan sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak. **JANGAN** mengumpan racun ini di tempat yang senang dicapai oleh kanak-kanak dan haiwan berguna.

TANDA KERACUNAN: Tanda Awal: Mual, muntah, cirit-birit, sakit perut, sakit kepala, kerengsaan (kemerahan, gatal), tremor (anggota badan bergesat), mengantuk, otot lemah, air liur berlebihan, anak mata mengelot, palup berlebihan, tanda teraingtung: Kerengsaan kulit (kemerahan, gatal), sawan, koma.

RAWTAN KECEMASAN: Jika terkena pakaian, tanggalkan kesemua pakaian, mandi dengan segera dan ganti pakaian yang bersih. Jika terkena pada kulit, bersihkan dengan sabun dan air yang banyak, jika terkena pada mata, tanggalkan kanta kontak. Jika ada alirak air yang banyak pada bahagian mata sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, **JANGAN** iktirakan untuk muntah dan **JANGAN** beri apa-apa melalui mulut. Jika terhidu, pindaikan mangsa ke kawasan pengucaraan yang bersih. Bawa mangsa ke Pusat Perubatan/Klinik/Hospital yang terdekat dengan segera. Dinasihatkan bawa bersama label atau bekas racun perosak.

BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.

MY80039387F

Bayer

勿貯藏在靠近食品或
兒童所接觸的地方

உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு
அருகில் வைக்காதீர்

KELAS IV

JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN
KANAK-KANAK

KELAS IV

KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND
CHILDREN