



# Racumin<sup>®</sup> Wax Block

## RACUN TIKUS

### UMPAN (RB)

UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG YANG TERLATIH SAHAJA.

Perawis Aktif: coumatetralyl.....0.0375% w/w  
Perawis Lengai:.....99.9625% w/w

No. Pendaftaran: LRMP. R1/9435

Kandungan Bersih: 20 kg (4 beg x 5 kg)

Batch No.:

Tarikh Mengilang:  
(YYYY/MM/DD)

Tarikh Luput:  
(YYYY/MM/DD)

Didaftarkan oleh:

**Bayer Co., (Malaysia) Sdn Bhd (7563 M)**  
B-19-1 & B-19-2, The Ascent Paradigm,  
No. 1, Jalan SS 7/26A, Kelana Jaya,  
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.  
Tel.: 03-7801 3088

Jika berlaku **KERACUNAN**, sila hubungi

**TALIAN KECEMASAN:**

**BACA LABEL SEBELUM GUNA**

**999**  
TALIAN KECEMASAN

## Tikus



**JAUHKAN DARIPADA  
MAKANAN DAN KANAK-KANAK**

**KELAS IV**

**KEEP AWAY FROM  
FOODSTUFF AND CHILDREN**

Racumin Wax Block ialah sejenis racun tikus yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan 'hydroxycoumatrin' yang bertindak secara anti-penggumpalan darah.  
**ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.**

KAWASAN	PEROSAK	CARA PENGGUNAAN
Kawasan Penternakan, Rumah Penyembelihan, Zoo, Pasar, Gudang, Depo Barangan, Tempat Pembiakan Sampah, Longkang, Kawasan Pembetulan dan Pelabuhan	Tikus Norway ( <i>Rattus norvegicus</i> ) Tikus Hitam ( <i>Rattus rattus diardi</i> ) Mencit Rumah ( <i>Mus musculus</i> )	Letak 5-10 ketul umpan di setiap stesen umpan. Letak stesen umpan berdekatan dengan lubang tikus dan juga sekitar perjalanan lazim yang digunakan oleh tikus (sekeliling perimeter bangunan dan juga kawasan yang terjumpa kesan aktiviti tikus seperti tapak kaki, najis dan kencing)
Sawit	Tikus Belukar ( <i>Rattus tiomanicus</i> )	Letak satu ketul umpan di pangkal setiap pokok kelapa sawit apabila banci bulanan menunjukkan kerosakan pada tandan buah melebihi 5%. Gantikan setiap umpan yang dimakan setiap minggu sehingga bilangan umpan yang diganti menurun ke paras 20%
Koko		Letakkan satu ketul umpan di pangkal pokok yang kelima dan gantikan setiap umpan yang dimakan sekali seminggu sehingga bilangan yang diganti menurun ke paras 20%
Sawah Padi	Tikus Sawah ( <i>Rattus argentiventer</i> )	Letak satu ketul umpan setiap 10 hingga 15 m di atas batas dan di hadapan lubang tikus, sebelum menabur biji benih atau sebelum mengubah. Pengumpulan berikutnya dilakukan dua minggu selepas menabur atau menanam dan gantikan umpan yang dimakan setiap minggu sehingga bilangan umpan yang diganti menurun ke paras 20%

**AWAS: a) Bahaya Kepada Manusia:** Berbahaya jika termakan. Elakkan daripada terhidu debu. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalkan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selapas mengendalkan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkuatkuat yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Pastikan cuci tangan sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak, **JANGAN** mengumpan racun ini di tempat yang senang dicapai oleh kanak-kanak dan haiwan ternakan dan peliharaan.

**b) Bahaya Kepada Alam Sekitar:** Produk ini adalah berbahaya pada organisma akuatik dan ikan. **JANGAN** mengikut peraturan Tempus, sarung, tangan, gogal, kasut getah, penutup muka dan alat pemelatan cemarkan kolam, sungai atau seliran air.

**TANDA KERACUNAN:** Lemah, hilang selera makan, pening, mual dan cirit-birit. Pendarahan pada kulit, gusi atau hidung. Air kencing dan najis berdarah.

**RAWATAN KECEMASAN:** Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, **JANGAN** khilarkan pesakit itu muntah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

**BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPSKANNYA.**  
**JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.**

**Bayer**

MY8446287F

**JAUHKAN DARIPADA  
MAKANAN DAN KANAK-KANAK**

**勿貯藏在靠近食品或  
兒童所接觸的地方**

അവകാശം ന്യൂനം  
അനുകൂലം ബയർ