

LARVA BAIT 1.0 GR ialah sejenis racun serangga tidak sistemik yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan organophosphate yang bertindak secara sentuhan dan keracunan perut dengan menghalang biosintesis enzim acetylcholinesterase (AChE).

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

Untuk kawalan jejentik nyamuk, gunakan **LARVA BAIT 1.0 GR** seperti berikut:

Tempat / Keadaan	Serangga	Kadar Racun	Cara Penggunaan
1) Bekas pengisi air, tangki air, penjerat semut dan pasu bunga.	Nyamuk (<i>Aedes aegypti</i> , <i>Aedes albopictus</i> , <i>culex quinquefasciatus</i>)	Gunakan 10 g bagi tiap-tiap 90 liter air. (bersamaan dengan 5 tin minyak tanah)	Tabur LARVA BAIT 1.0 GR dengan rata dan ulangkan penggunaanya 2-3 bulan sekali, jika perlu.
2) Kawasan air cetek, kolam air, parit-parit dan becak.		5 kg/hektar permukaan air.	

AWAS

a) **Bahaya Kepada Manusia:** Berbahaya jika tertelan. Elakkan daripada terhadu debu. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. **JANGAN** mengumpan racun ini di tempat yang senang dicapai oleh kanak-kanak dan binatang berguna. Pastikan basuh badan sebersih-bersihnya dengan sabun dan air yang banyak. **Pakaian dan Alat Perlindungan:** Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawaian termasuk sarung tangan, gogol, kasut getah, penutup muka dan alat pernafasan.

b) **Bahaya Pada Alam Sekitar:** Produk ini adalah berbahaya pada organisme akuatik dan ikan. **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

TANDA KERACUNAN

Berpeluh, pening, sakit kepala, mual, muntah, pandangan kabur, sesak nafas, cirit-birit, kejang otot dan besar ludah.

RAWATAN KECEMASAN

Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, **JANGAN** ikhtiarikan pesakit itu muntah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN

Suntik Atropina sulfat (2-4 mg) secara intravena atau intraotot. Ulangkan setiap 30 minit sehingga pesakit itu pulih sepenuhnya. Kemudian suntik pralidoksim (1 g) secara intravena, jika perlu.

MEDICAL TREATMENT

Inject Atropine sulphate (2-4 mg) intravenously or intramuscularly. Repeat every 30 minutes until the patient is fully atropinised. Then administer pralidoxime (1 g) intravenously, if necessary.

勿貯藏在靠近食品或
兒童所接觸的地方

KELAS IV

உணவுகள் மற்றும் குழந்தை
களுக்கு அருகில் வைக்காதீர்

LARVA BAIT 1.0 GR

RACUN SERANGGA / INSECTICIDE
BUTIR (GR)

UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG YANG TERLATIH SAHAJA



Perawis Aktif: temephos 1.0% w/w
Perawis Lengai: 99.0% w/w

No. Pendaftaran : LRMP. R1/9790

Kandungan Bersih : 100 g

Tarikh Mengilang :

Didaftarkan oleh :



Bright Resource Technology Sdn. Bhd. (517165-A)
No. 11-2, Jalan Meranti SD 13/4,
Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel.: 03-6272 1678 Faks: 03-6272 9528

Jika berlaku **KERACUNAN**, sila hubungi:

PUSAT RACUN NEGARA - 1-800-88-8099 (waktu pejabat)
- 012-430 9499 (lepas waktu pejabat)

BACA LABEL SEBELUM GUNA



BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA.
JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.
EMPTY PESTICIDE CONTAINER SHOULD BE TRIPLE RINSED BEFORE DISPOSAL. DO NOT USE EMPTY PESTICIDE CONTAINER TO STORE FOODSTUFF.

**JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN
KANAK-KANAK**

KELAS IV

**KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND
CHILDREN**