

Makfor® F



RACUN SERANGGA GEL
UNTUK KAWALAN MAKHLUK PEROSAK (PCO) SAHAJA
UNTUK KEGUNAAN KESIHATAN AWAM SAHAJA

Perawis Aktif: fipromil.....0.05 % w/w
Perawis Lengai:.....99.95 % w/w

UNTUK DIKENDALIKAN OLEH OPERATOR KAWALAN
MAKHLUK PEROSAK (PCO) BERLESEN SAHAJA
UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG
YANG TERLATIH SAHAJA.

ADALAH MENJADI KESALAHAN MENJUAL
PRODUK INI SECARA BERASINGAN

No. Pendaftaran: LRMP. R2/8659

Kandungan Bersih: 2.4 kg (30 g x 40 penyuntik x 20 kotak)

Tarikh Mengilang:

Tarikh Luput:

Batch No.:

Didaftarkan oleh:
Bayer Co. (Malaysia) Sdn Bhd (7563 M)
B-19-1 & B-19-2, The Ascent Paradigm, No. 1,
Jalan SS 7/26A, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia. Tel.: 03-7801 3088
Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi

999

TALIAN KECEMASAN:

BACA LABEL SEBELUM GUNA

JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN KANAK-KANAK

KELAS IV

KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND CHILDREN

Makfor® F ialah sejenis racun serangga yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan 'phenylpyrazole' yang bertindak secara sentuhan dan racunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

TEMPAT / KAWASAN	TAHAP INFESTASI	SERANGGA	LIPAS AMERIKA DAN ORIENTAL (<i>Periplaneta americana</i>)
Domestik, industri, kesihatan awam, di sekitar dapur, kabinet, lantai, dinding, di bawah sinki, di sudut terpenjil, celah keretakan,	Rendah	LIPAS JERMAN (<i>Blattella germanica</i>)	2 titik 0.1 g / meter persegi (m ²)
	Tinggi	1-2 titik 0.1 g / meter persegi (m ²) 3-4 titik 0.1 g / meter persegi (m ²)	3 titik 0.1 g / meter persegi (m ²)

● Saiz gel yang dicadangkan berdiameter 5 mm bersamaan dengan 0.1 g Makfor® F.

Tempat rawatan hendaklah selalu diperiksa. Ulangi rawatan jika perlu atau bila umpan habis dimakan oleh lipas.
Panduan Menyuntik: Tempatkan gel di celah raiakan bangunan, lubang, stor dan kawasan terlindung di mana ia merupakan tempat lipas aktif membiak. Ulangi mengumpam gel apabila serangga perosak masih berkekalan. Selepas itu, kekerapan meletakkan gel boleh dikurangkan untuk menjaga populasi serangga pada tahap yang boleh diterima. Jangan sembur racun serangga lain ke atas gel kerana ia menyebabkan gel menjadi penghalau kepada lipas. Jangan tempatkan gel pada/berhampiran dengan makanan/tempat penyediaan makanan termasuk makanan binatang ternakan/peliharaan.

AWAS: a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertelan. Elakkan daripada terhidu wasap atau kabut semburan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalik produk ini, JANGAN makan, minum atau merokok. Selepas mengendalik produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakannya. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak. Pakailah dan Alat Pelindungan: Ketika mengendalik produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpakaian termasuk sarung tangan, gogal, kasut getah, penutup muka dan alat pernafasan mengikut kesesuaian (Rujuk Risalah Data Keselamatan).
b) Bahaya Pada Alam Sekitar: Produk ini adalah berbahaya pada organisma akuatik, ikan dan lebah. JANGAN cemarkan kolam, sungai atau saliran air dan JANGAN sembur semasa lebah aktif mencari makanan.

TANDA KERACUNAN:

Tanda Awal: Mual, muntah, batuk, pedih ulu hati, sakit perut, sakit kepala, cepat marah, keresahan, pening, tekak tidak selesa, mengantuk, sawan, koma.

Tanda Tertangguh: Tiada tanda keracunan spesifik. Segera dapatkan rawatan sekiranya mengalami sebarang tanda umum keracunan seperti mual, muntah, sakit perut, air liur berlebihan, sakit tekak, sesak nafas, ketat dada, nafas laju, berdebar-debar, gangguan deria rasa, kemerahan pada bahagian terdedah, sawan, koma atau sebarang masalah kesihatan.

RAWATAN KECEMASAN: Jika terkena pakaian, tanggalkan kesemua pakaian, mandi dengan segera dan ganti pakaian yang bersih. Jika terkena pada kulit, bersihkan dengan sabun dan air yang banyak. Jika terkena pada mata, tanggalkan kanta lekap (jika ada) alirkan air yang banyak pada bahagian mata sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, JANGAN iktiharkan untuk muntah dan JANGAN beri apa-apa melalui mulut. Jika terhidu, pindahkan mangsa ke kawasan pengudaraan yang bersih. Bawa mangsa ke Pusat Perubatan/Klinik/Hospital yang terdekat dengan segera. Dinisbatkan bawa bersama label atau bekas racun perosak.

BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA.
JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.

Bayer

勿貯藏 在 靠近 食品 或
兒童 所 接觸 的 地方

KELAS IV

உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு
அருகில் வைக்காது

MY8088336F