

Q-Bayt® WG10

 

RACUN SERANGGA
UNTUK KAWALAN MAKHLUK PEROSAK (PCO) SAHAJA
PERAWIS Aktif: imidacloprid.....10.0% w/w
Perawis Lengkap.....90.0% w/w

BUTIR TERSERAK AIR (W/G)
UNTUK KAWALAN MAKHLUK PEROSAK (PCO) SAHAJA
PERAWIS Aktif: imidacloprid.....10.0% w/w
Perawis Lengkap.....90.0% w/w

UNTUK DIKENDALIKAN OLEH OPERATOR KAWALAN MAKHLUK PEROSAK (COLEH ORANG YANG TERLIBAT SAHAJA

No. Pendataman: LRMP. R2/6382

Kandungan Bersih: 250 g

Tarikh Menglang:

Batch No.:

Didarftarkan oleh:
Bayer Co., (Malaysia) Sdn Bhd (7263 M)
No. 19-1 & B-19-2, The Scent Paradigm,
Jalan SS 7/6A, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
Tel: 03-78013088

jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi
ITALIAN KECEMASAN:

BERBAHAYA
JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN KANAK-KANAK

999 

BACA LABEL SEBELUM GUNA

HARMFUL
KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND CHILDREN

KELAS III

有害品
勿貯藏在靠近食品或
兒童所接觸的地方

திருக்கோயில் புதி
வினாக்கள் விடுமுடிவு திருக்கோயில் புதி
கலை அரசாங்கத்தில்

Bayer

AWAS: a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertelan. Elakkan dari pada kumpulan 'neonicotinoid' yang bertindak secara sensitif dan keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

TEMPAT **SERANGGA PEROSAK** **CATATAN**

TEMPAT	SERANGGA PEROSAK	CATATAN
Kawasan pentemakan haiwan (ayam, babi, kambing, lembu, kuda), kawasan perumahan dan perindustrian, hotel, restoran dan tempat pembuangan sampah.	Lalat (<i>Musca domestica</i> , <i>Fannia canicularis</i> , <i>Chrysomya megacephala</i> , <i>Lucilia cuprina</i>)	Larutkan 250 g produk di dalam 2 liter air bagi setiap 100 m². Disyorkan pemantauan pada hari ke-3, 7, 14 dan 28 selepas rawatan.

Panduan Membancu: Q-Bayt WG10 boleh digunakan dengan penyeimbur berkemasan rendah (~1 bar). Larutkan 250 g kacau sehingga rata. Jangan simpan baki buncuhan Q-Bayt WG10 di dalam tangki alat penyeimbur.

Panduan Menyembur: Sembur Q-Bayt WG10 pada 40 m² kawasan dinding dan setiap 100 m² kawasan lantai. Rawat kawasan di mana lalat berkumpul seperti pada ketinggian dipling 2 meter, sekitar tingkap dan lain-lain permukaan rumah. Untangi rawatan apabila infestasi adalah tinggi.

Untuk kawasan penyediaan makanan, sila pastikan semua ditempat tertutup dan luar dari kawasan rawatan. Elakkan makaran perkakas makanan atau peralatan yang tersentuh dengan makanan, permukaan yang mana makanan disediakan atau disimpan. Jangan sembur pada tempat penyediaan makanan atau permukaan di mana makanan dihidangkan.

TANDA AWAL: Mual, muntah, ciri-biri, sakit perut, sakit kepala, kerengsaan (kemerahan, gatal, tremor, langgor, badan bergetar), mengantuk, otot lemah, air liur berlebihan, anak mata mengelip, putus berlebihan.

TANDA KERACUNAN: Tanda Awal: Keringesaan (kemerahan, gatal, kerengsaan, mengantuk, otot lemah, air liur berlebihan, anak mata mengelip, putus berlebihan).

TANDA TERTANGGUH: Keringesaan kulit (kemerahan, gatal, savan, koma).

RASAWATAN KECEMASAN: Jika terkena pakaiannya yang bersih, jika terkena pada kulit, bersihkan dengan sabun dan air yang banyak. Jika terkena pada mata, ranggalkan kanta lekor (jika ada) alkiran air yang banyak pada bagian mata sekurang-kurangnya 15 minit. Jika terlepas, JANGAN ikhtiarikan untuk muntahnya sendiri. Jika berlaku manganisa ke Kawasan pengcederaan yang terdekat dengan segera. Dinasiratkan bawa bersama label atau bekas racun perosak.

AWAS: a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertelan. Elakkan dari pada kumpulan 'neonicotinoid' yang bertindak secara sensitif dan keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

TEMPAT **SERANGGA PEROSAK** **CATATAN**

TEMPAT	SERANGGA PEROSAK	CATATAN
Kawasan pentemakan haiwan (ayam, babi, kambing, lembu, kuda), kawasan perumahan dan perindustrian, hotel, restoran dan tempat pembuangan sampah.	Lalat (<i>Musca domestica</i> , <i>Fannia canicularis</i> , <i>Chrysomya megacephala</i> , <i>Lucilia cuprina</i>)	Larutkan 250 g produk di dalam 2 liter air bagi setiap 100 m². Disyorkan pemantauan pada hari ke-3, 7, 14 dan 28 selepas rawatan.

Panduan Membancu: Q-Bayt WG10 boleh digunakan dengan penyeimbur berkemasan rendah (~1 bar). Larutkan 250 g kacau sehingga rata. Jangan simpan baki buncuhan Q-Bayt WG10 di dalam tangki alat penyeimbur.

Panduan Menyembur: Sembur Q-Bayt WG10 pada 40 m² kawasan dinding dan setiap 100 m² kawasan lantai. Rawat kawasan di mana lalat berkumpul seperti pada ketinggian dipling 2 meter, sekitar tingkap dan lain-lain permukaan rumah. Untangi rawatan apabila infestasi adalah tinggi.

Untuk kawasan penyediaan makanan, sila pastikan semua ditempat tertutup dan luar dari kawasan rawatan. Elakkan makaran perkakas makanan atau peralatan yang tersentuh dengan makanan, permukaan yang mana makanan disediakan atau disimpan. Jangan sembur pada tempat penyediaan makanan atau permukaan di mana makanan dihidangkan.

AWAS: a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertelan. Elakkan dari pada kumpulan 'neonicotinoid' yang bertindak secara sensitif dan keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

TEMPAT **SERANGGA PEROSAK** **CATATAN**

TEMPAT	SERANGGA PEROSAK	CATATAN
Kawasan pentemakan haiwan (ayam, babi, kambing, lembu, kuda), kawasan perumahan dan perindustrian, hotel, restoran dan tempat pembuangan sampah.	Lalat (<i>Musca domestica</i> , <i>Fannia canicularis</i> , <i>Chrysomya megacephala</i> , <i>Lucilia cuprina</i>)	Larutkan 250 g produk di dalam 2 liter air bagi setiap 100 m². Disyorkan pemantauan pada hari ke-3, 7, 14 dan 28 selepas rawatan.

Panduan Membancu: Q-Bayt WG10 boleh digunakan dengan penyeimbur berkemasan rendah (~1 bar). Larutkan 250 g kacau sehingga rata. Jangan simpan baki buncuhan Q-Bayt WG10 di dalam tangki alat penyeimbur.

Panduan Menyembur: Sembur Q-Bayt WG10 pada 40 m² kawasan dinding dan setiap 100 m² kawasan lantai. Rawat kawasan di mana lalat berkumpul seperti pada ketinggian dipling 2 meter, sekitar tingkap dan lain-lain permukaan rumah. Untangi rawatan apabila infestasi adalah tinggi.

Untuk kawasan penyediaan makanan, sila pastikan semua ditempat tertutup dan luar dari kawasan rawatan. Elakkan makaran perkakas makanan atau peralatan yang tersentuh dengan makanan, permukaan yang mana makanan disediakan atau disimpan. Jangan sembur pada tempat penyediaan makanan atau permukaan di mana makanan dihidangkan.

AWAS: a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertelan. Elakkan dari pada kumpulan 'neonicotinoid' yang bertindak secara sensitif dan keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

TEMPAT **SERANGGA PEROSAK** **CATATAN**

TEMPAT	SERANGGA PEROSAK	CATATAN
Kawasan pentemakan haiwan (ayam, babi, kambing, lembu, kuda), kawasan perumahan dan perindustrian, hotel, restoran dan tempat pembuangan sampah.	Lalat (<i>Musca domestica</i> , <i>Fannia canicularis</i> , <i>Chrysomya megacephala</i> , <i>Lucilia cuprina</i>)	Larutkan 250 g produk di dalam 2 liter air bagi setiap 100 m². Disyorkan pemantauan pada hari ke-3, 7, 14 dan 28 selepas rawatan.

Panduan Membancu: Q-Bayt WG10 boleh digunakan dengan penyeimbur berkemasan rendah (~1 bar). Larutkan 250 g kacau sehingga rata. Jangan simpan baki buncuhan Q-Bayt WG10 di dalam tangki alat penyeimbur.

Panduan Menyembur: Sembur Q-Bayt WG10 pada 40 m² kawasan dinding dan setiap 100 m² kawasan lantai. Rawat kawasan di mana lalat berkumpul seperti pada ketinggian dipling 2 meter, sekitar tingkap dan lain-lain permukaan rumah. Untangi rawatan apabila infestasi adalah tinggi.

Untuk kawasan penyediaan makanan, sila pastikan semua ditempat tertutup dan luar dari kawasan rawatan. Elakkan makaran perkakas makanan atau peralatan yang tersentuh dengan makanan, permukaan yang mana makanan disediakan atau disimpan. Jangan sembur pada tempat penyediaan makanan atau permukaan di mana makanan dihidangkan.

AWAS: a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertelan. Elakkan dari pada kumpulan 'neonicotinoid' yang bertindak secara sensitif dan keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

TEMPAT **SERANGGA PEROSAK** **CATATAN**

TEMPAT	SERANGGA PEROSAK	CATATAN
Kawasan pentemakan haiwan (ayam, babi, kambing, lembu, kuda), kawasan perumahan dan perindustrian, hotel, restoran dan tempat pembuangan sampah.	Lalat (<i>Musca domestica</i> , <i>Fannia canicularis</i> , <i>Chrysomya megacephala</i> , <i>Lucilia cuprina</i>)	Larutkan 250 g produk di dalam 2 liter air bagi setiap 100 m². Disyorkan pemantauan pada hari ke-3, 7, 14 dan 28 selepas rawatan.

Panduan Membancu: Q-Bayt WG10 boleh digunakan dengan penyeimbur berkemasan rendah (~1 bar). Larutkan 250 g kacau sehingga rata. Jangan simpan baki buncuhan Q-Bayt WG10 di dalam tangki alat penyeimbur.

Panduan Menyembur: Sembur Q-Bayt WG10 pada 40 m² kawasan dinding dan setiap 100 m² kawasan lantai. Rawat kawasan di mana lalat berkumpul seperti pada ketinggian dipling 2 meter, sekitar tingkap dan lain-lain permukaan rumah. Untangi rawatan apabila infestasi adalah tinggi.

Untuk kawasan penyediaan makanan, sila pastikan semua ditempat tertutup dan luar dari kawasan rawatan. Elakkan makaran perkakas makanan atau peralatan yang tersentuh dengan makanan, permukaan yang mana makanan disediakan atau disimpan. Jangan sembur pada tempat penyediaan makanan atau permukaan di mana makanan dihidangkan.

AWAS: a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertelan. Elakkan dari pada kumpulan 'neonicotinoid' yang bertindak secara sensitif dan keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

TEMPAT **SERANGGA PEROSAK** **CATATAN**

TEMPAT	SERANGGA PEROSAK	CATATAN
Kawasan pentemakan haiwan (ayam, babi, kambing, lembu, kuda), kawasan perumahan dan perindustrian, hotel, restoran dan tempat pembuangan sampah.	Lalat (<i>Musca domestica</i> , <i>Fannia canicularis</i> , <i>Chrysomya megacephala</i> , <i>Lucilia cuprina</i>)	Larutkan 250 g produk di dalam 2 liter air bagi setiap 100 m². Disyorkan pemantauan pada hari ke-3, 7, 14 dan 28 selepas rawatan.

Panduan Membancu: Q-Bayt WG10 boleh digunakan dengan penyeimbur berkemasan rendah (~1 bar). Larutkan 250 g kacau sehingga rata. Jangan simpan baki buncuhan Q-Bayt WG10 di dalam tangki alat penyeimbur.

Panduan Menyembur: Sembur Q-Bayt WG10 pada 40 m² kawasan dinding dan setiap 100 m² kawasan lantai. Rawat kawasan di mana lalat berkumpul seperti pada ketinggian dipling 2 meter, sekitar tingkap dan lain-lain permukaan rumah. Untangi rawatan apabila infestasi adalah tinggi.

Untuk kawasan penyediaan makanan, sila pastikan semua ditempat tertutup dan luar dari kawasan rawatan. Elakkan makaran perkakas makanan atau peralatan yang tersentuh dengan makanan, permukaan yang mana makanan disediakan atau disimpan. Jangan sembur pada tempat penyediaan makanan atau permukaan di mana makanan dihidangkan.

AWAS: a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertelan. Elakkan dari pada kumpulan 'neonicotinoid' yang bertindak secara sensitif dan keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

TEMPAT **SERANGGA PEROSAK** **CATATAN**

TEMPAT	SERANGGA PEROSAK	CATATAN
Kawasan pentemakan haiwan (ayam, babi, kambing, lembu, kuda), kawasan perumahan dan perindustrian, hotel, restoran dan tempat pembuangan sampah.	Lalat (<i>Musca domestica</i> , <i>Fannia canicularis</i> , <i>Chrysomya megacephala</i> , <i>Lucilia cuprina</i>)	Larutkan 250 g produk di dalam 2 liter air bagi setiap 100 m². Disyorkan pemantauan pada hari ke-3, 7, 14 dan 28 selepas rawatan.

Panduan Membancu: Q-Bayt WG10 boleh digunakan dengan penyeimbur berkemasan rendah (~1 bar). Larutkan 250 g kacau sehingga rata. Jangan simpan baki buncuhan Q-Bayt WG10 di dalam tangki alat penyeimbur.

Panduan Menyembur: Sembur Q-Bayt WG10 pada 40 m² kawasan dinding dan setiap 100 m² kawasan lantai. Rawat kawasan di mana lalat berkumpul seperti pada ketinggian dipling 2 meter, sekitar tingkap dan lain-lain permukaan rumah. Untangi rawatan apabila infestasi adalah tinggi.

Untuk kawasan penyediaan makanan, sila pastikan semua ditempat tertutup dan luar dari kawasan rawatan. Elakkan makaran perkakas makanan atau peralatan yang tersentuh dengan makanan, permukaan yang mana makanan disediakan atau disimpan. Jangan sembur pada tempat penyediaan makanan atau permukaan di mana makanan dihidangkan.

AWAS: a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertelan. Elakkan dari pada kumpulan 'neonicotinoid' yang bertindak secara sensitif dan keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

TEMPAT **SERANGGA PEROSAK** **CATATAN**

TEMPAT	SERANGGA PEROSAK	CATATAN
Kawasan pentemakan haiwan (ayam, babi, kambing, lembu, kuda), kawasan perumahan dan perindustrian, hotel, restoran dan tempat pembuangan sampah.	Lalat (<i>Musca domestica</i> , <i>Fannia canicularis</i> , <i>Chrysomya megacephala</i> , <i>Lucilia cuprina</i>)	Larutkan 250 g produk di dalam 2 liter air bagi setiap 100 m². Disyorkan pemantauan pada hari ke-3, 7, 14 dan 28 selepas rawatan.

Panduan Membancu: Q-Bayt WG10 boleh digunakan dengan penyeimbur berkemasan rendah (~1 bar). Larutkan 250 g kacau sehingga rata. Jangan simpan baki buncuhan Q-Bayt WG10 di dalam tangki alat penyeimbur.

Panduan Menyembur: Sembur Q-Bayt WG10 pada 40 m² kawasan dinding dan setiap 100 m² kawasan lantai. Rawat kawasan di mana lalat berkumpul seperti pada ketinggian dipling 2 meter, sekitar tingkap dan lain-lain permukaan rumah. Untangi rawatan apabila infestasi adalah tinggi.

Untuk kawasan penyediaan makanan, sila pastikan semua ditempat tertutup dan luar dari kawasan rawatan. Elakkan makaran perkakas makanan atau peralatan yang tersentuh dengan makanan, permukaan yang mana makanan disediakan atau disimpan. Jangan sembur pada tempat penyediaan makanan atau permukaan di mana makanan dihidangkan.

AWAS: a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertelan. Elakkan dari pada kumpulan 'neonicotinoid' yang bertindak secara sensitif dan keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

TEMPAT **SERANGGA PEROSAK** **CATATAN**

TEMPAT	SERANGGA PEROSAK	CATATAN
Kawasan pentemakan haiwan (ayam, babi, kambing, lembu, kuda), kawasan perumahan dan perindustrian, hotel, restoran dan tempat pembuangan sampah.	Lalat (<i>Musca domestica</i> , <i>Fannia canicularis</i> , <i>Chrysomya megacephala</i> , <i>Lucilia cuprina</i>)	Larutkan 250 g produk di dalam 2 liter air bagi setiap 100 m². Disyorkan pemantauan pada hari ke-3, 7, 14 dan 28 selepas rawatan.

Panduan Membancu: Q-Bayt WG10 boleh digunakan dengan penyeimbur berkemasan rendah (~1 bar). Larutkan 250 g kacau sehingga rata. Jangan simpan baki buncuhan Q-Bayt WG10 di dalam tangki alat penyeimbur.

Panduan Menyembur: Sembur Q-Bayt WG10 pada 40 m² kawasan dinding dan setiap 100 m² kawasan lantai. Rawat kawasan di mana lalat berkumpul seperti pada ketinggian dipling 2 meter, sekitar tingkap dan lain-lain permukaan rumah. Untangi rawatan apabila infestasi adalah tinggi.

Untuk kawasan penyediaan makanan, sila pastikan semua ditempat tertutup dan luar dari kawasan rawatan. Elakkan makaran perkakas makanan atau peralatan yang tersentuh dengan makanan, permukaan yang mana makanan disediakan atau disimpan. Jangan sembur pada tempat penyediaan makanan atau permukaan di mana makanan dihidangkan.

AWAS: a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertelan. Elakkan dari pada kumpulan 'neonicotinoid' yang bertindak secara sensitif dan keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

TEMPAT **SERANGGA PEROSAK** **CATATAN**

TEMPAT	SERANGGA PEROSAK	CATATAN
Kawasan pentemakan haiwan (ayam, babi, kambing, lembu, kuda), kawasan perumahan dan perindustrian, hotel, restoran dan tempat pembuangan sampah.	Lalat (<i>Musca domestica</i> , <i>Fannia canicularis</i> , <i>Chrysomya megacephala</i> , <i>Lucilia cuprina</i>)	Larutkan 250 g produk di dalam 2 liter air bagi setiap 100 m². Disyorkan pemantauan pada hari ke-3, 7, 14 dan 28 selepas rawatan.

Panduan Membancu: Q-Bayt WG10 boleh digunakan dengan penyeimbur berkemasan rendah (~1 bar). Larutkan 250 g kacau sehingga rata. Jangan simpan baki buncuhan Q-Bayt WG10 di dalam tangki alat penyeimbur.

Panduan Menyembur: Sembur Q-Bayt WG10 pada 40 m² kawasan dinding dan setiap 100 m² kawasan lantai. Rawat kawasan di mana lalat berkumpul seperti pada ketinggian dipling 2 meter, sekitar tingkap dan lain-lain permukaan rumah. Untangi rawatan apabila infestasi adalah tinggi.

Untuk kawasan penyediaan makanan, sila pastikan semua ditempat tertutup dan luar dari kawasan rawatan. Elakkan makaran perkakas makanan atau peralatan yang tersentuh dengan makanan, permukaan yang mana makanan disediakan atau disimpan. Jangan sembur pada tempat penyediaan makanan atau permukaan di mana makanan dihidangkan.

AWAS: a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertelan. Elakkan dari pada kumpulan 'neonicotinoid' yang bertindak secara sensitif dan keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

TEMPAT **SERANGGA PEROSAK** **CATATAN**

TEMPAT	SERANGGA PEROSAK	CATATAN
<tbl_info cols="3