



# Aqua Resigen®

RACUN SERANGGA EMULSI, MINYAK DALAM AIR (EW)  
UNTUK KAWALAN MAKHLUK PEROSAK (PCO) SAHAJA  
UNTUK KEGUNAAN KESIHATAN AWAM SAHAJA

Perawis Aktif: s-bioallethrin.....0.14% w/w  
permethrin (25/75)..10.27% w/w  
piperonyl butoxide....9.84% w/w  
Perawis Lengai:.....79.75% w/w

UNTUK DIKENDALIKAN OLEH OPERATOR KAWALAN  
MAKHLUK PEROSAK (PCO) BERLESEN SAHAJA  
UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG  
YANG TERLATIH SAHAJA

No. Pendaftaran: LRMP. R/3752

Kandungan Bersih: 1 liter

Tarikh Mengilang:

Tarikh Luput: -----

Batch No.:

Didaftarkan oleh:


Bayer Co. (Malaysia) Sdn Bhd (7563 M)  
B-19-1 & B-19-2, The Ascent Paradigm,  
No. 1, Jalan SS 7/26A, Kelana Jaya,  
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.  
Tel.: 03-7801 3088

Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi  
TALIAN KECEMASAN:

999  
TALIAN KECEMASAN NEGARA

BACA LABEL SEBELUM GUNA

**BERBAHAYA**  
JAUHKAN DARIPADA  
MAKANAN DAN KANAK-KANAK



LALAT

NYAMUK

**KELAS III**

Aqua Resigen® ialah sejenis racun serangga yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan 'pyrethroid' yang bertindak secara tidak sistemik, sentuhan dan keracunan perut.

**ATURAN PENGGUNAAN:** Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

TEMPAT	SERANGGA	TEKNIK PENGGUNAAN	KADAR PENCAIRAN	CATATAN
Kawasan perumahan dan perniagaan	Nyamuk / Mosquitoes ( <i>Aedes aegypti</i> , <i>Culex quinquefasciatus</i> )	Pengabutan terma - Luar rumah (Outdoor)	10 ml/liter (1:100)	Gunakan 10 liter setiap hektar dengan mesin yang tinggi pengeluaran (30-130 liter/jam).
			20 ml/liter (1:50)	Gunakan 5 liter setiap hektar dengan mesin yang rendah pengeluaran (12-25 liter/jam).
	Lalat / Flies ( <i>Musca domestica</i> )	Pengabutan terma - Dalam rumah (Indoor)	20 ml/liter (1:50)	700 ml bancuhan setiap 2000 m <sup>2</sup> .
			Ultra low volume (ULV) - Luar rumah (Outdoor)	Gunakan 500 ml setiap hektar.
		Ultra low volume (ULV) - Dalam rumah (Indoor)	50 ml/liter (1:20)	Gunakan 1 liter setiap hektar.
			50 ml/liter (1:20)	40 ml bancuhan setiap 300 m <sup>2</sup> .

**Panduan Membancuh:** Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan Aqua Resigen secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan banchuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi daripada yang disyorkan. Jangan simpan baki banchuhan Aqua Resigen di dalam tangki alat penyembur.

**Panduan Menyembur:** Untuk kawalan yang baik, sembur pada waktu awal pagi atau lewat petang. Jangan sembur apabila keadaan angin melebihi 10 km/j. Ulangi semburan selang 7-10 hari jika perlu. Untuk kawasan penyediaan makanan, pastikan semua bahan makanan dan peralatan memasak perlu disimper di tempat tertutup dan jauh dari kawasan rawatan. Elakkan tersentuh dengan makanan, perkakas makanan atau permukaan yang mana makanan disediakan atau disimpan. Jangan sembur pada tempat penyediaan makanan atau permukaan di mana makanan dihidangkan.

**AWAS:** a) **Bahaya Kepada Manusia:** Berbahaya jika tertelan. Elakkan daripada terhidu wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan sejuk. Cuci alat penyembur/pengabut sebersih-bersihnya selepas menggunakannya. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak.

**Pakaian dan Alat Perlindungan:** Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindungan diri (PPE) berpiawai termasuk sarung tangan, gogal, kasut getah, penutup muka dan alat pefafasan mengikut kesesuaian (Rujuk Risalah Data Keselamatan).

b) **Bahaya Pada Alam Sekitar:** Produk ini adalah berbahaya pada organsima akuatik dan ikan. **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

### TANDA KERACUNAN:

**Tanda Awal:** Mual, muntah, cirit-birit, kerengsaan mata (kemerahan, gatal), pening, keletihan, paresthesia (rasa kebas, terbakar, sejuk, semut-semut, menyucuk, merayap), air liur berlebihan, demam, penglihatan kabur, takikardia (berdebar-debar), nafas berbunyi seperti wisel, mengantuk, sawan, koma.

**Tanda Tertangguh:** Tiada tanda keracunan spesifik. Segera dapatkan rawatan sekiranya mengalami sebarang tanda umum keracunan seperti mual, muntah, sakit perut, air liur berlebihan, sakit tekak, sesak nafas, ketat dada, nafas laju, berdebar-debar, gangguan deria rasa, kemerahan pada bahagian terdedah, sawan, koma atau sebarang masalah kesihatan.

**RAWATAN KECEMASAN:** Jika terkena pakaian, tanggalkan kesemua pakaian, mandi dengan segera dan ganti pakaian yang bersih. Jika terkena pada kulit, bersihkan dengan sabun dan air yang banyak. Jika terkena pada mata, tanggalkan kanta lekap (jika ada) alirkan air yang banyak pada bahagian mata sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, **JANGAN** ikhtiarikan untuk muntah dan **JANGAN** beri apa-apa melalui mulut. Jika terhidu, pindahkan mangsa ke kawasan pengudaraan yang bersih. Bawa mangsa ke Pusat Perubatan/Klinik/Hospital yang terdekat dengan segera. Dinasihatkan bawa bersama label atau bekas racun perosak.

**BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.**

**EMPTY PESTICIDE CONTAINER SHOULD BE TRIPLE (3) RINSED BEFORE DISPOSAL. DO NOT USE EMPTY PESTICIDE CONTAINER TO STORE FOODSTUFF.**

Bayer

MY566218261

**HARMFUL**  
KEEP AWAY FROM  
FOODSTUFF AND CHILDREN

**有毒品**  
勿貯藏在靠近食品或  
兒童所接觸的地方

**தீங்கழைப்பது**  
உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு  
அருகில் வைக்காதீர்