



# Makfor<sup>®</sup>Q

RACUN SERANGGA

GEL

UNTUK KAWALAN MAKHLUK PEROSAK (PCO) SAHAJA  
UNTUK KEGUNAAN KESIHATAN AWAM SAHAJA

Perawis Aktif: imidacloprid.....0.03% w/w  
Perawis Lengai:.....99.97% w/w

UNTUK DIKENDALIKAN OLEH OPERATOR KAWALAN  
MAKHLUK PEROSAK (PCO) BERLESEN SAHAJA  
UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG  
YANG TERLATIH SAHAJA.

No. Pendaftaran: LRMP. R2/8548

Kandungan Bersih: 2.4 kg (30 g x 20 tiub x 4 kotak)

Batch No.:

Tarikh Mengilang:

Tarikh Luput: .....

Didaftarkan oleh:  
Bayer Co. (Malaysia) Sdn Bhd (7563 M)  
B-19-1 & B-19-2, The Ascent Paradigm,  
4001 Jalan SS 7/26A, Kelana Jaya,  
40150 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.  
Tel.: 03-7801 3088



Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi  
TALIAN KECEMASAN:

BACA LABEL SEBELUM GUNA

MY80980299D

KEEP AWAY FROM  
FOODSTUFF AND  
CHILDREN

JAUHKAN DARIPADA  
MAKANAN DAN  
KANAK-KANAK

KELAS IV

**Makfor<sup>®</sup> Q** ialah rumusan gel yang sedia digunakan untuk mengawal semut di kawasan komersial dan industri. Guna gel di kawasan semut di tempat yang ditentukan samada untuk kegunaan dalaman ataupun kegunaan luaran.

**ATURAN PENGGUNAAN:** Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

<b>TEMPAT</b>	Tempat kediaman (termasuk dapur), hotel, restoran, tempat penyimpanan makanan, tempat sembelih, hospital, tandas awam, dewan serbaguna, gereja, pangkung wayang.
<b>SERANGGA PEROSAK</b>	Semut Firau ( <i>Monomorium pharaonis</i> ), Semut Meyat ( <i>Tapinoma melanocephalum</i> ), Semut Argentina ( <i>Linepithema humile</i> ), Semut Hitam ( <i>Lasius niger</i> )
<b>CATATAN</b>	Kegunaan Dalama: 1 titik 200 mg setiap m <sup>2</sup> rawatan untuk semut firau dan semut meyat. 1 titik 200 mg produk setiap linear meter jalan semut hitam. Kegunaan Luar: <i>Lasius niger</i> dan species lain: jalan rawatan koloni, suntik terus 2 g produk ke jalan masuk koloni semut. Untuk rawatan jalan semut, guna 1 titik 200 mg setiap linear meter sehingga maksima 2 g per koloni.

Adalah disyorkan penantahan pada hari ke-3, 7, 14 dan 28 selepas rawatan. Ulangi rawatan apabila infestasi adalah tinggi.

**Makfor<sup>®</sup> Q** dibekalkan dalam bentuk tiub 30 g. Sekiranya kandungan tiub tidak dihabiskan, tutup hujung tiub dengan alat penutup yang disertakan dan simpan seperti yang disarankan.

**Panduan Menyuntik: Penggunaan di dalam bangunan:** Guna **Makfor<sup>®</sup> Q** terus sebagai titik ('spot') di kawasan yang dikenalpasti. Pastikan kawasan yang dirawat tidak dibasahi. Sekiranya **Makfor<sup>®</sup> Q** dibekalkan di dalam bentuk 'bait station', letakkan 'bait station' di tempat semut mencari makanan. Letakkan satu (1) 'bait station' pada jalan semut di bawah pintu, tingkap atau rekahan.

**Penggunaan di luar bangunan:** **Makfor<sup>®</sup> Q** boleh diletakkan pada rekahan dan celah (pada dinding batu, di antara 2 kepingan simen) di mana jalan semut adalah nyata. Titik ('spot') **Makfor<sup>®</sup> Q** haruslah diletakkan di tempat terlindung daripada hujan. Sekiranya **Makfor<sup>®</sup> Q** dibekalkan di dalam bentuk 'bait station', letakkan 'bait station' di tempat semut mencari makanan.

Letakkan satu (1) 'bait station' pada jalan semut yang nyata dan jauhkan daripada cahaya matahari dan hujan.

Gunakan span yang basah untuk membersihkan titik ('spot') yang berlebihan di kawasan yang dirawat.

Untuk kawasan penyediaan makanan, sila pastikan semua bahan makanan dan peralatan memasak perlu disimpan ditempat tertutup dan jauh dari kawasan rawatan. Elakkan tersentuh dengan makanan, perkakas makanan atau permukaan yang mana makanan disediakan atau disimpan. Jangan guna pada tempat penyediaan makanan atau permukaan di mana makanan dihidangkan.

**AWIAS:** a) Bahaya. Kepada Manusia. Berbahaya jika terelan. Elakkan daripada terhidu gel. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikn produk ini, JANGAN makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikn produk ini, pastikan tiub bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat terkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan ditingi. Cuci alat tiub sebersih-bersihnya selepas menggunakannya. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak. Pakailah Alai Perlindungan, ketika mengendalikn produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpakaian termasuk sarung tangan, goggles, kasut getah, penutup muka dan alat pemalasan mengikut kesesuaian (Rujuk Risalah Data Keselamatan).  
b) Bahaya Pada Alam Sekitar. Produk ini adalah berbahaya pada organisma akuatik dan ikan. JANGAN cemarkan kolam, sungai atau saluran air.

**TANDA KERACUNAN:**

**Tanda Awal:** Mual, muntah, cirit-birit, sakit perut, sakit kepala, kerengsaan (kemerahan, gatal, remor (anggota badan bengkak), menguntuk, otid lenah, air liur berlebihan, anak mata mengelot, pelun berkelehan.

**Tanda Terlanggah:** Kerengsaan kulit (kemerahan, gatal), sawan, koma.

**RAWATAN KECEMASAN:** Jika terkena pakaian, tanggalkan kesemua pakaian mandi dengan segera dan ganti pakaian yang bersih. Jika terkena pada kulit, bersihkan dengan sabun dan air yang banyak. Jika terkena pada mata, tanggalkan kontak lena (jika ada) aliran air yang banyak pada balaian mata sekurang-kurangnya 15 minit. Jika terelan, JANGAN ikhtirakan untuk muntah dan JANGAN beri apa-apa melalui mulut. Jika terhidu, pinatkan mangsa ke kawasan pengudaraan yang bersih. Bawa mangsa ke Pusat Perubatan/Klinik/Hospital yang terdekat dengan segera. Dimashtakan bawa bersama label atau bekas racun perosak.

**BILAS BEKAS KOSONG, TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.**

Bayer

勿貯藏在靠近食品或  
兒童所接觸的地方

உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு  
அருகில் வைக்காது

Restricted to COMPETITORS ONLY