

# Storm<sup>®</sup>



RACUN TIKUS

UMPAN BERBUNGKAH (BB)



Perawis Aktif : flocoumafen .....	0.005% w/w
Perawis Lengai : .....	99.995% w/w

**PRODUK INI TIDAK DISYORKAN JIKA BURUNG PUNGGUK JELAPANG DIGUNAKAN UNTUK MENGAWAL TIKUS.**

No. Pendaftaran: LRMP. R8/2995

Kandungan Bersih: 10 kg

Tarikh Mengilang:

Tarikh Luput:

No. Kelompok:

Didaftarkan oleh :

**BASF (Malaysia) Sdn. Bhd.** 198901005366

Lot 19.02, Level 19, 1 Powerhouse, No. 1,

Persiaran Bandar Utama,

Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

Tel.: 03-7612 1888 Faks: 03-7612 1777

P(L) 06/21

Jika berlaku **KERACUNAN**,  
sila hubungi **TALIAN KECEMASAN:**



No. Talian Kecemasan Syarikat : 03-5628 3999  
**BACA LABEL SEBELUM GUNA**

**Akta Racun Makhluk Perosak 1974.**

KAWASAN TANAMAN	PEROSAK	KADAR RACUN SEHEKTAR	CARA PENGGUNAAN
Sawit	Tikus ( <i>Rattus tiomanicus</i> )	136 Ketul umpan <b>STORM</b> <sup>®</sup>	Letakkan satu ketul umpan di pangkal setiap pokok sawit apabila banci bulanan menunjukkan kerosakan pada tandan buah melebihi 5%. Gantikan setiap umpan yang dimakan setiap minggu sehingga bilangan umpan yang diganti menurun ke paras 20%.
Koko	Tikus ( <i>Rattus rattus diardii</i> )	160 Ketul umpan <b>STORM</b> <sup>®</sup>	Mula mengumpan apabila kerosakan melebihi 50 lenggai sehektar. Letakkan satu ketul umpan di pangkal pokok yang kelima dan gantikan setiap umpan yang dimakan sekali seminggu sehingga bilangan yang diganti menurun ke paras 20%.
Sawah Padi	Tikus ( <i>Rattus argentiventer</i> )	22 Ketul umpan <b>STORM</b> <sup>®</sup>	Letakkan satu ketul umpan setiap 10 hingga 15 m di atas batas dan di hadapan lubang tikus, sebelum menabur biji benih atau sebelum mengubah. Pengumpanan berikutnya dilakukan dua minggu selepas menabur atau menanam dan gantikan umpan yang dimakan setiap minggu sehingga bilangan umpan yang diganti menurun ke paras 20%.

**Nota:** Kebanyakan serangan tikus dapat dikawal dalam 30 hari.

**STORM**<sup>®</sup> adalah dalam bentuk sedia digunakan dan tidak perlu dicampur dengan bahan makanan lain.

**AWAS:** a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertelan. Elakkan daripada terhidu debu. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Pastikan cuci tangan sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak. **JANGAN** mengumpan racun ini di tempat yang senang dicapai oleh kanak-kanak dan haiwan berguna.

Pakaian dan Alat Perlindungan: Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian perlindungan diri (PPE) berpiawaian termasuk sarung tangan, kasut getah dan penutup muka mengikut kesesuaian (Rujuk Risalah Data Keselamatan).

b) Bahaya Pada Alam Sekitar: Produk ini adalah berbahaya pada organisma akuatik dan ikan. **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

**TANDA KERACUNAN:**

**Tanda Awal:** Mual, muntah, sakit perut.

**Tanda Tertangguh:** Kecenderungan pendarahan (lebam, gusi berdarah, najis berdarah, hidung berdarah, gusi berdarah), keletihan, mati.

CROPS AREAS	PESTS	RATES PER HECTARE	APPLICATION
Oil Palm	Rats ( <i>Rattus tiomanicus</i> )	136 Cubes <b>STORM</b> <sup>®</sup> bait	Place one bait at the base of each palm when the monthly census show more than 5% fresh fruit damage. Replace all baits taken weekly until bait replacement is brought down to 20%.
Cocoa	Rats ( <i>Rattus rattus diardii</i> )	160 Cubes <b>STORM</b> <sup>®</sup> bait	Commence baiting when rat damage exceed 50 pods/ha. Place one bait at base of every 5th tree and replace all bait taken weekly until bait replacement is brought down to 20%.
Padi	Rats ( <i>Rattus argentiventer</i> )	22 Cubes <b>STORM</b> <sup>®</sup> bait	Place one bait every 10 to 15 m on bund and in front of burrows, before sowing or transplanting, follow up baiting should be done two weeks after sowing or transplanting and subsequently replace baits taken weekly until bait replacement is brought down to 20%.

**RAWATAN KECEMASAN:**

Jika terkena pakaian, tanggalkan kesemua pakaian, mandi dengan segera dan ganti pakaian yang bersih. Jika terkena pada kulit, bersihkan dengan sabun dan air yang banyak. Jika terkena pada mata, tanggalkan kanta lekap (jika ada) alirkan air yang banyak pada bahagian mata sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, **JANGAN** ikhtiarkan untuk muntah dan **JANGAN** beri apa-apa melalui mulut. Jika terhidu, pindahkan mangsa ke kawasan pengudaraan yang bersih. Bawa mangsa ke Pusat Perubatan/Klinik/Hospital yang terdekat dengan segera. Dinasihatkan bawa bersama label atau bekas racun perosak.



**BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.**